



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ที่ สด ๗๒๔๐๕/-

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เรื่อง รายงานผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการเน้นย้ำแนวทางการป้องกันโรคที่มีุงกลายเป็นพาหะนำโรค โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันโรคและควบคุมโรค นั้น

ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้ดำเนินการกิจกรรม เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุวิมล ไบมะหาด)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็น.....

(นายบัณฑิต เละกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ความเห็น

☒ ทราบ

☐ ไม่ทราบ

(นายดลิสะ จิตกาหลง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ



ป้องกัน ยุงลายกัด เพื่อลูกน้อย

ยุงลาย เป็นพาหะนำโรคติดเชื้อไวรัสซิกา หากแม่ติดเชื้อไวรัสซิกา เด็กที่คลอดออกมา อาจมีภาวะเสี่ยงศีรษะเล็กตั้งแต่แรกเกิด และมีผลต่อพัฒนาการทางสมองและสติปัญญา ในระยะยาว

วิธีป้องกัน

นอนในมุ้ง



ทายากันยุง



ผลกระทบ




ทารกที่ติดเชื้อไวรัสซิกา เมื่อคลอดออกมาจะมีศีรษะเล็กกว่าเด็กปกติ และมีพัฒนาการช้า

มาร่วมมือกัน



ทุกคนสามารถป้องกันคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกาได้ โดยการป้องกันตนเองไม่ให้ยุงลายกัด และร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามภาชนะที่มีน้ำขัง ทั้งในบ้านและรอบบ้าน เพื่อตัดวงจรการเกิดของยุงลาย หากทุกบ้านร่วมกัน จะช่วยให้ลดการระบาดของโรคได้

บ้าน คนท้อง ลูกนํายุงลายต้องเป็นศูนย์



สตรีมีครรภ์

ระวังยุงกัด!! ติดเชื้อไวรัสซิกา มีโอกาส
ทำให้ทารกแรกเกิด "ศีรษะเล็ก พัฒนาการช้า"



อาการ



มีไข้



ตาแดง



ผื่นแดง



ปวดข้อ

ป้องกันยุงกัด

- ทายากันยุง
- นอนในมุ้ง
- สวมเสื้อผ้ามิดชิด

การ ป้องกัน

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

- เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน
- ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ
- ปล่ายปลา กับ ลูกน้ำ
- กำจัดขยะหรือเศษวัสดุขังน้ำ

โรคติดเชื่อไวรัสซิกา แพร่ระบาดอย่างไร




ยุงลายเพศเมียเมื่อผสมพันธุ์แล้ว
จะต้องการเลือด เพื่อพัฒนาไข่ยุง
และวางไข่ เพื่อแพร่พันธุ์



ผู้ป่วย

ติดเชื่อไวรัสซิกา

หากยุงลายกัดผู้ป่วยก็จะได้รับเชื่อไวรัสซิกา



ยุงลาย

มีเชื่อไวรัสซิกา

หากไปกัดคนอื่นๆ จะทำให้ติดเชื่อ
ไวรัสซิกา และเกิดการระบาดใน
วงกว้าง



คนทั่วไป

หากติดเชื่อไวรัสซิกา มีอาการ
ไม่รุนแรง สามารถแพร่เชื่อผ่าน
ยุงกัด และทางเพศสัมพันธ์



คนท้อง

เมื่อติดเชื่อไวรัสซิกา อาจมีผลกระทบต่อ
ทารกในครรภ์ ซึ่งเชื่อสามารถติดต่อจากแม่
สู่ลูกทางสายสะดือ เด็กที่คลอดออกมาอาจมี
ภาวะเสี่ยงศีรษะเล็กตั้งแต่แรกเกิด และมีผล
ต่อพัฒนาการทางสมองและสติปัญญา ใน
ระยะยาว

เมื่อยุงลายมีเชื่อไวรัสซิกา
เชื่อนั้นจะอยู่จนหมดอายุขัย



วางไข่

ยุงลายที่มีเชื่อไวรัสซิกา เมื่อวางไข่
สามารถแพร่เชื่อไวรัสซิกา ไปสู่รุ่นลูกได้

อาการโรคติดเชื่อไวรัสซิกา



มีจุดแดงเล็ก ๆ
ขึ้นตามตัว



มีไข้



ตาแดง



ปวดตามข้อ



ปวดศีรษะ
ปวดกล้ามเนื้อ

หากมีอาการสงสัยติดเชื่อไวรัสซิกาให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที